

## ÉLETKORHOZ KÖTÖTTEN KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSOK

### A 2021. ÉVI OLTÁSI NAPTÁR

#### Folyamatos oltások

Oltás	Életkor	Megjegyzés
<b>BCG</b>	<b>újszülött korban</b>	Bacillus Calmette-Guérin/tuberculosis elleni oltóanyag
<b>DTPa + IPV + Hib + PCV13</b>	<b>2 hónap</b>	DTPa = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag Hib = Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag IPV = inaktivált poliovírus vakcina PCV13 = 13-valens konjugált pneumococcus vakcina
<b>DTPa + IPV + Hib</b>	<b>3 hónap</b>	
<b>DTPa + IPV + Hib + PCV13</b>	<b>4 hónap</b>	
<b>PCV13</b>	<b>12 hónap</b>	PCV13 = 13-valens konjugált pneumococcus vakcina
<b>Bárányhimlő</b>	<b>13 hónapos</b>	Varilrix
<b>MMR</b>	<b>15 hónap</b>	morbilli-mumpsz-rubeola elleni vakcina
<b>Bárányhimlő</b>	<b>16 hónapos</b>	Varilrix
<b>DTPa + IPV + Hib</b>	<b>18 hónap</b>	DTPa = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag Hib = Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag IPV = inaktivált poliovírus vakcina
<b>DTPa + IPV</b>	<b>6 év</b>	DTPa = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag IPV = inaktivált poliovírus vakcina

- **Menjugate (dobozdíjas – NEM KÖTELEZŐ)**

Adagolás: 2-11 hónapos - 2 oltás 2 hónapos időközzel.

12 hó fölött és felnőtteknek: 1 oltás

- **NeisVac-C (dobozdíjas – NEM KÖTELEZŐ)**

Az egy év alatti, de két hónapos kort betöltött csecsemők legalább 2 hónapos időközzel, két alkalommal oltandók. Az 1 év feletti gyermekek, a serdülők és a felnőttek immunizálásához egy oltás szükséges. *Konjugált vakcinával egy éves kor alatt alapimmunizált (2 oltás) csecsemőket 2 éves korban javasolt újraoltani.*

# TÁJÉKOZTATÓ A NEM KÖTELEZŐ OLTÁSOKRÓL, ALKALMAZÁSUK MÓDJÁRÓL

## 1. Bárányhimlő

**Varilrix 2018.07.31. után született gyermekeknek ingyenes és kötelező**

9 hónapos kortól 12 éves korig: 1 adag

13 éves kortól: 2 adag

Az oltóanyag 6-10 évre véd, de a kórokozóval való találkozás felfrissíti az immunitást.

## 2. Meningococcus-B

**Bexsero kb 34-35.000 Ft/adag (szabadáras!)**

2 és 5 hónapos kor között: 3+1 adag

3 és 5 hó között 2+1 adag

6 és 23 hónapos kor között: 2+1 adag

2 év felett: 2 adag

Ezek a baktériumok súlyos, néha életveszélyes fertőzéseket okozhatnak

## 3. Hepatitis – A

**Vaqta Junior**

2-17 év: 1x0,5 ml, majd 6-18 hónap múlva 1x0,5 ml emlékeztető oltás.

Felnőtteknek: 1x1ml, majd 6-18 hónap múlva 1x1ml emlékeztető oltás

**Havrix 720 junior**

1 évestől betöltött 18 éves korig adható. A védettséghez szükséges emlékeztető oltást az első adag beadását követő 6 hónap és 5 év között bármikor sor kerülhet, de előnyösebb az első vakcinációt követő 6-12 hónapban.

## 4. Hepatitis A és B

**Twinrix gyermekeknek**

A Twinrix Gyermekek vakcina csecsemők, gyermekek és serdülők oltására alkalmas egyéves kortól betöltött 15 éves korig, és két betegség, a hepatitisz A és hepatitisz B fertőzések megelőzésére. Az oltás a szervezetben ellenanyag képződést indít el, ami védelmet biztosít a megbetegedésekkel szemben. A teljes védettség eléréséhez 3 oltás szükséges

## **5. Kullancsencephalitis**

### **Encepur Junior**

Adagolás: 2-12 éves kor között 2 oltás 1 hónapos időközzel, majd egy harmadik 9-12 hó múlva. Emlékeztető oltás 3 évente.

Nyári hónapokban az oltási köz csökkenthető. Célszerű az első két adagot a téli hónapokban beadni.

### **FSME -IMMUN Junior**

Adagolás: 1-16 év között 3 oltás szükséges, 2 oltás 1 hónapos időközzel, a harmadik 12 hónap múlva. Célszerű az első két adagot a téli hónapokban beadni. Emlékeztető oltás: 3 évente.

## **6. Rota vírus okozta hasmenés**

### **Rotarix (kb. 17-18.000 Ft/adag –szabadárás)**

Adagolás: Az oltási sorozat **két adagból** áll. Az első adag 6 hetes kortól adható. Az adagok között legalább 4 hetes időszaknak kell lennie. A vakcinációt lehetőleg 16 hetes kor előtt el kell végezni, de 24 hetes korig be kell fejezni.

### **RotaTeq**

Adagolás: Az immunizáláshoz **3 dózis** RotaTeq beadása szükséges, a dózisok beadása között legalább 4 hetet kell várni. Az első dózist legkésőbb 12 hetes korig és mindhárom dózist lehetőleg 20 hetes korig be kell adni. 26 hetes korig be kell fejezni az oltási sorozatot.

Mindkét vakcina egyidőben adható az életkorhoz kötött védőoltásokkal.

**Kizárólag csecsemők oltására, szájon át alkalmazható.**